



Insecticide concentré pour l'application en pulvérisation basse pression. S'utilise pour le traitement des insectes rampants: blattes orientales et germaniques, punaises des lits, puces, fourmis, poisons d'argent, etc. à l'intérieur des bâtiments.



Grâce à sa formulation microencapsulée, le **PESTSTOP COMBI 8 CS** dispose d'une action rapide ainsi que rémanente. Son efficacité est préservée longtemps grâce à la libération progressive de la substance active protégée dans les microcapsules. Il peut être utilisé même sur les surfaces poreuses, parce que les capsules s'attachent bien aux surfaces variées.


PRODUIT BIOCIDÉ

Usage professionnel

DURÉE DE CONSERVATION:
2 ans


CONDITIONNEMENT:
1 litre/flacon
12 flacons/carton

COMPOSITION



5,9 % (61 g/l) Perméthrine

La perméthrine est utilisée comme insecticide chimique, de la famille des pyréthrinoïdes. La cible de cet insecticide est le système nerveux des insectes.



2,6 % (27 g/l) Cyperméthrine

La cyperméthrine est une substance active qui présente un effet insecticide, et qui appartient à la famille chimique des pyréthrinoïdes de synthèse qui agit par contact et par ingestion.

Synergiste: 7,6 % (79 g/l) Piperonil Butoxide



DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Avant de préparer la dilution agitez le flacon de concentré. Le refermez immédiatement après utilisation. Remplissez le pulvérisateur à moitié avec de l'eau. Mesurer la quantité de produit nécessaire et diluer le dans 2 à 3 fois ce volume d'eau dans un récipient à part. Rajoutez ce mélange dans le pulvérisateur, complétez jusqu'au volume désiré et agitez bien le tout.

Pulvériser les endroits où les insectes peuvent se cacher et les surfaces fréquentées. Contre les insectes volants traiter si possible les murs et parois par pulvérisation en évitant un trop grand ruissellement du produit.

Dose d'application contre les insectes rampants:

160 ml pour 5 litres de bouillie pour traiter une surface de 100-150 m² en cas de forte infestation

125 ml pour 5 litres de bouillie pour traiter une surface de 100-150 m² en cas d'infestation réduite

Dose d'application contre les insectes volants:

60 ml pour 5 litres de bouillie pour traiter une surface de 100 m²

La bouillie doit être agitée régulièrement pendant le traitement et être utilisée le jour même. Lors du traitement le concentré peut laisser une trace blanchâtre, il est donc recommandé de faire un test sur une surface cachée.

Durée de l'action biocide: 14 à 16 semaines

PRECAUTIONS

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards. Très toxique pour organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Conserver hors de portée des enfants.

Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Ne réoccuper les locaux qu'après séchage du produit et une bonne aération.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

